令和7年度 芦屋町 小児定期予防接種

★接種可能な医療機関★

≪実施医療機関≫ ※事前に必ず予約をしてください。

医療機関名	柿木医院	町外の医療機関	
電話番号	223-0027		
実施時間	月·火·水·金 8:30~12:00/14:00~17:30 木·土 8:30~12:00	福岡県内の「予防接種広域化実施医療機関」でも接種できます。 医療機関一覧については、福岡県医師会ホームページをご確認ください。	
≪受けられる予防接種≫	柿木医院		
ロタウイルス感染症			
B型肝炎	•		
Hib感染症	•	福岡県医師会HP	
小児肺炎球菌感染症	•	примента п	
五種混合	•	福岡県内の「予防接種広域化実施医療機関」以外の医療機関や、 福岡県外で接種をされる場合、	
結核(BCG)	•	福岡宗がで接煙をされる場合、 健康・こども課 こども家庭センターで発行する「予防接種依頼書」	
麻しん・風しん(MR)	•	が必要になります。	
水痘	•	ホームページを確認していただくか、 健康・こども課 こども家庭センターまでご連絡ください。 (☎ 093-223-3577)	
日本脳炎	•		
二種混合	•		
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がんワクチン)			

★接種する時の注意点★

- □医療機関に事前に予約しましょう。
- □母子健康手帳を必ず持参しましょう。
- 口お子さんの日ごろの状態をよく知る保護者が連れていきましょう。
- □子どもの予防接種を保護者以外の人が同伴する時は委任状が必要です。

委任状は、ホームページでダウンロードすることが可能です。また、医療機関にも置いてあります。

★対象年齢と接種回数★

		回数	対象年齢	標準的な接種年齢	
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	2回	出生6週0日後から24週0日後	初回接種は	
感染症 ロタテック(5価)		3回	出生6週0日後から32週0日後	生後2カ月〜出生14週6日後まで	
B型肝炎		3回	1歳未満(11カ月の間まで)	生後2~9カ月未満	
Hib感染症 小児肺炎球菌感染症		4回	生後2カ月~5歳未満(4歳の間まで)	生後2~7カ月未満	
ジフテリア・百日せき・破傷風・ ポリオ・Hib(五種混合)		4回	生後2カ月~7歳6カ月未満(7歳5カ月の間まで)	1~3回目:生後2~7カ月 4回目は、3回目終了後、6カ月~1年6カ月の 間隔をあける	
結核(BCG)		10	1歳未満(11カ月の間まで)	生後5~8カ月未満	
麻しん・風しん(MR)		1期:1回	1期:生後12~24カ月未満(1歳の間まで)	1歳になったらなるべく早く	
		2期:1回	2期:小学校就学前の1年間	年長児	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
水痘		2回	生後12~36カ月未満(1・2歳児)	1回目の接種は1~1歳3カ月 2回目は、1回目終了後、6カ月~1年の間 隔をあける	
日本脳炎		1期:3回	1期:生後6カ月~7歳6カ月未満(7歳5カ月の間まで)	1、2回目:3歳 3回目:4歳	
		2期:1回	2期:9~13歳未満(12歳の間まで)	9歳	
ジフテリア・破傷風(二種混合)		1回	2期 ※四種混合の続き :11~13歳未満(12歳の間まで)	11歳	
ピトパピロー マウイルス感 染症 (子宮頸がん	サーバリックス(2価) ガーダシル(4価)	3回	12歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	中学1年生	
	シルガード(9価)	3回	※15歳未満で1回目を接種した場合は2回接種 ※2回目を5カ月未満の間隔で接種した場合は3回目の接種が必要です。	\daggeria_1.2_1.4-T	

(多有)					
定期予防接種 対象疾患(ワクチン)		対象月年齢	標準的な接種月年齢		接種回数と間隔(接種間隔の起算日は、接種した日の翌日です。)
ロタウイルス感染症〈ロタリックス(1価)〉 出生6週0日後から24週0日後〈ロタテック(5価)〉 出生6週0日後から32週0日後		- 初回接種は2カ月〜14週6日後		〈ロタリックス〉 ① → ② 27日以上	
				〈ロタテック〉 ① → ② → ③ 27日以上 27日以上	
B型肝炎	1歳未満(1	1カ月の間まで)	生後2~9カ月未満		① → ② → ③(追加) 27日以上 1回目から139日以上
				初回接種開始時期	① → ② → ③ → ④(追加) 27日以上 27日以上 7カ月以上
Hib感染症	生後2カ月~5歳未満 (4歳の間まで) 初回接種開始時の月年 齢によって、接種回数や 間隔が異なります。		標準	生後2~7カ月未満	※初回は、標準的には27日~56日の間隔で3回行う。 ※2回目・3回目の接種は生後12カ月に至るまでに行うこと。 <u>これを超えた場合は行わない</u> <u>こと</u> (追加接種は27日以上の間隔をおいて可)。 ※4回目(追加)は標準的には、初回接種終了後7~13カ月の間隔で行う。
			標準以外	生後7カ月~1歳未満	① → ② → ③(追加) 27日以上 7カ月以上 ※初回は、標準的には27日~56日の間隔で2回行う。 ※2回目までの接種は生後12カ月に至るまでに行うこと。これを超えた場合は行わないこと(追加接種は27日以上の間隔をおいて可)。 ※3回目(追加)は標準的には、初回接種終了後7~13カ月の間隔で行う。
				1~5歳未満	1回
			標準	生後2~7カ月未満	① → ② → ③ → ④(追加) 27日以上 27日以上 60日以上 ※2回目までの接種は生後12カ月に至るまでに行うこと。これを超えた場合は、3回目は行わないこと(追加接種は可)。 ※2回目・3回目の接種(標準的な接種期間は3回を生後12カ月まで)は生後24カ月に至るまでに行うこと。これを超えた場合は行わないこと(追加接種は可)。 ※4回目(追加)は、生後12カ月に至った日以降に行うこと。標準的な接種期間は、生後12~15カ月。
			標準以外	生後7カ月~1歳未満	① → ② → ③(追加) 27日以上 60日以上 ※2回目までの接種(標準的な接種期間は生後12カ月まで)は生後24カ月に至るまでに行うこと。これを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可) ※3回目(追加)は、生後12カ月に至った日以降に行うこと。
			- X/1°	1~2歳未満	① → ②(追加) 60日以上
				2~5歳未満	1回
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・	1期初回	生後2~90カ月未満	生後2~	~12カ月	① → ② → ③ 各20日以上(標準的には20~56日)の間隔で3回接種
Hib (五種混合)	1期追加	(7歳5カ月の間まで)		回終了後6カ月〜1年6カ月 開終了後6カ月以上あける)	1回
結核(BCG)	1歳未満(1	1カ月の間まで)	生後5~8カ月		1回
	1期 生後 ² (1歳の間	12〜24カ月未満 まで)			1回 過去に麻しん、風しんのいずれかにかかったことがある人も、この混合ワクチンを接種でき
麻しん・風しん(MR)	2期 小学校就学前の1年間 年長児			ます。	
	※令和4年4	1月2日~令和5年4月1日に生	まれた人	(1期特例)及び、平成30年4月	2日~平成31年4月1日に生まれた人(2期特例)は、令和8年度までに限り定期予防接種ができます。 -
水痘	生後12~	36カ月未満(1·2歳児) -	1回目の接種は1~1歳3カ月		① → ② 3カ月以上(標準的には6~12カ月)の間隔で2回接種
	1期初回 生後6~90カ月未満 (7歳5カ月の間まで)		3歳		① → ②6日以上(標準的には6~28日)の間隔で2回接種
日本脳炎			4歳		1回 初回終了後6カ月以上(標準的にはおおむね1年)経ってから。
	2期	9~13歳未満 (12歳の間まで)	9歳		1回
	※平成7年4月2日~平成19年4月1日に生まれた人で、接種が十分 医師と相談のうえ、不足分を接種するようにしましょう。			・ はい場合、20歳未満(19歳の間)まで定期予防接種ができます。接種が完了していない人は、	
ジフテリア・破傷風 (二種混合)		重混合の続き) 未満(12歳の間まで)			10
	子宮頸 接種) ※平成9年4月2日~平成 19年4月1日に生まれた女 子のうち、令和7年3月31 日までに1回でもキャッチ アップ接種をした人は、令 和7年度まで無料で接種 できます。		初回接種開始時期		 / : , ル.ガード(0.価)の場合\
			15歳未満 標準的な接種月年齢は中学1年生 (13歳になる学年)		※2回目を、1回目から5カ月未満の間隔で接種した場合、3カ月以上の間隔をおいて3回目の接種が必要
			15歳以上		① → ② → ③ ③ - 2カ月 1回目から6カ月後に
					<ガーダシル(4価)の場合> ① → ② → ③ 2カ月 1回目から6カ月後に <サーバリックス(2価)の場合> ① → ② → ③ 1カ月 1回目から6カ月後に
			種すること。		
			年齢等が随時変更される提合がありますのでご注音ください P7 / 7改正		